



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

**CONSUMO DE ALCOHOL Y VIOLENCIA FAMILIAR EN
ADOLESCENTES, VILLA EL SALVADOR, LIMA 2020**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO
ACADÉMICO DE BACHILLER EN PSICOLOGÍA**

AUTORA

AROTINCO VELASQUEZ, NORMA ANTONIA

ORCID: 0000-0003-1237-4432

ASESOR

VALLE RIOS, SERGIO ENRIQUE

ORCID: 0000-0003-0878-6397

CHIMBOTE – PERÚ

2021

Equipo de trabajo

Autora

Arotinco Velásquez, Norma Antonia

ORCID: 0000-0003-1237-4432

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado,
Chimbote, Perú

Asesor

Valle Ríos, Sergio Enrique

ORCID: 0000-0003-0878-6397

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias de La Salud,
Escuela Profesional de Psicología, Chimbote, Perú

Jurado

Cucho Hidalgo, Yazmin de Fátima

ORCID: 0000-0002-0508-160X

Velásquez Temoche, Susana Carolina

ORCID: 0000-0003-3061-812X

Abad Núñez, Celia Margarita

ORCID: 0000-0002-8605-7344

Jurado evaluador

Mgr. Yazmín de Fátima Cucho Hidalgo

Presidente

Mgr. Susana Carolina Velásquez Temoche

Miembro

Mgr. Celia Margarita Abad Núñez

Miembro

Mgr. Sergio Enrique Valle Ríos

Asesor

Agradecimiento

Al señor rector de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Rvdo. Padre Juan Roger Rodríguez Ruiz, por su desinteresado compromiso con la investigación.

A mi docente tutor Sergio Enrique, Valle Ríos, por la dedicación y enseñanza en el proceso de mi investigación.

Dedicatoria

Agradezco a Dios por haber permitido realizar este proyecto de investigación, y a mis tres hijas, que han estado conmigo en cada momento, apoyándome, sosteniéndome en cada etapa de mi desarrollo profesional.

Resumen

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el Consumo de Alcohol y Violencia Familiar en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020. La metodología utilizada en esta investigación fue tipo cuantitativo ya que se recogerá los datos obtenidos para probar las hipótesis ya establecidas. Nivel de investigación fue relacional porque se analizarán las cualidades de las variables y no se hará un mayor análisis estadístico. Diseño no experimental ya que no realiza control ni manipula sus variables para su estudio, de corte transversal porque se recolectarán los datos en un único y momento. El universo fueron adolescentes de Villa el Salvador. La población estuvo constituida por adolescentes de la Avenida Pastor Sevilla, Villa el Salvador, con una muestra de 30 adolescentes. Y para la selección de los participantes se utilizó un muestreo no probabilístico por cuotas, que consistió en establecer una muestra que involucre a personas que pertenecen a una población, eligiéndose de acuerdo con sus rasgos o cualidades. Llegando a la conclusión de que no existe relación entre ambas variables ($p= 0,241$).

Palabras clave: consumo de alcohol, violencia familiar, adolescentes

Abstract

The objective of this research work was to determine the relationship between Alcohol Consumption and Family Violence in adolescents, Villa el Salvador, Lima 2020. The methodology used in this research was quantitative since the data obtained will be collected to test the hypotheses already established. Research level was correlational because the qualities of the variables will be analyzed and no further statistical analysis will be done. Non-experimental design since it does not control or manipulate its variables for its cross-sectional study, because the data will be collected in a single moment. The universe were adolescents from Villa el Salvador. The population consisted of adolescents from Avenida Pastor Sevilla, Villa el Salvador, with a sample of 30 adolescents. And for the selection of the participants, a non-probabilistic quota sampling was used, which consisted of establishing a sample that involves people belonging to a population, being chosen according to their traits or qualities. Reaching the conclusion that there is no relationship between both variables ($p = 0.241$).

Keywords: alcohol use, family violence, adolescents

Índice de contenido

Equipo de trabajo	2
Jurado evaluador	3
Agradecimiento	4
Índice de tablas	10
Índice de figuras	11
Introducción	12
1. Revisión de la literatura	18
1.1 Antecedentes	18
1.1.1. Nacional	18
1.1.2. Local	18
1.2. Bases teóricas de la investigación	20
1.2.1 Consumo de Alcohol	20
1.2.2. Violencia familiar	24
1.2.3. Adolescente	26
2. Hipótesis	27
3. Método	28
3.1. El tipo de investigación	28
3.2. Nivel de la investigación	28
3.3. Diseño de la investigación	28
3.4. El Universo, población y muestra	29

3.5.	Operacionalización de las variables	30
3.6.	Técnicas e instrumentos de recolección datos	30
3.6.1.	Técnica de la encuesta	30
3.7.	Plan de análisis	31
3.8.	Principios éticos	31
4.	Resultados	32
4.1.	Resultados	32
4.2.	Discusión	37
5.	Conclusiones	41
	Referencias	42
	Apéndice	47
	Apéndice A. Instrumentos de evaluación	47
	Apéndice B. Consentimiento informado	49
	Apéndice C. Cronograma de actividades	50
	Apéndice D. Presupuesto	51
	Apéndice E. Ficha técnica del instrumento de evaluación	52
	Apéndice F. Matriz de consistencia	55

Índice de tablas

Tabla 1.....	32
Tabla 2.....	32
Tabla 3.....	32
Tabla 4.....	33
Tabla 5.....	34
Tabla 6.....	34
Tabla 7.....	35
Tabla 8.....	36

Índice de figuras

Figura 1.....	32
Figura 2.....	33
Figura 3	34
Figura 4	35
Figura 5	35

Introducción

El consumo del alcohol es un problema actual sino que viene desde hace años no basta decir que se debe consumir con responsabilidad sino que no se debe de consumir estas sustancias porque son perniciosas para la salud, aunque está permitido legalmente la adquisición de diversas sustancias denominadas drogas, porque al parecer "son menos dañinas", esto provoca su consumo excesivo y que esta muchas veces al alcance de todo tipo de persona (niños, adolescentes, adultos, ancianos, mujeres, etc.), y son estos los que hoy en día van causando diversos problemas. (Sánchez Escribano, 2019).

Organización Mundial de la Salud (ONU, 2018), la prevalencia del consumo excesivo episódico ha degradado a nivel mundial desde un 22.6% en el año 2000 a 18.2% en el 2016, siendo aun alto entre bebedores, en particular en los países de Europa de Este y alguna parte de Africa Subsahariana con mas del 60% de consumidores. Mas de la cuarta parte del mundo el 26.5% de jóvenes entre las edades de 15 a 19 años son consumidores actuales, esta cifra asciende a los 155 millones de adolescentes, siendo su prevalencia alta en la región de Europa de la OMS con un 43.8%, seguida la región de las Americas con un 38.2% y la región del Pacifico Occidental con un 37.9%.

Por otro lado, según el grupo de noticia Radio Programas del Perú (RPP, 2015), trabajando conjuntamente con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas lanzó una campaña de sensibilización con el fin de prevenir el consumo de alcohol a menores de edad. Por esta razón Luis Alberto Otárola Peñaranda, sustentó que esta campaña podrá tener efectos en la conducta de los jóvenes, les servirá para prevenir el consumo de alcohol en menores y a la vez para que toda la comunidad pertinente pueda involucrarse en esta problemática.

Según un estudio realizado por Cedro, en el Perú más de un millón 700 mil son adictos al alcohol. Este estudio revela que 1'736,138 de personas presentan problemas severos de alcohol, revelando que el 46,6% de chicos entre las edades de 12 a 18 años de edad ha consumido por primera vez, mientras que el 83% de los jóvenes entre las edades de 19 a 24 años reconocen haberlo consumido.

Por otro lado según los resultados de las encuestas escolares muestran que muchos países como América, Europa y Pacífico Occidental comienzan su consumo antes de los 15 años de edad, siendo su prevalencia de consumo en estudiantes de 15 años en un rango del 50 al 70% con una cantidad notable entre niños y niñas.

En relación a los patrones de ingesta de alcohol, en todos los países de la OMS, las mujeres consumen con menos costumbre que los hombres. Siendo más de la población femenina son más sobrias de por vida.

Finalmente este estudio reveló que la brecha de consumo de alcohol entre ambos géneros femenino y masculino ya no es tan grande, siendo un 77% mujeres y hombres un 81%, siendo de igual modo la diferencia entre sierra y selva. Asimismo el consumo de alcohol entre los jóvenes atendidos por consumo de alcohol dentro de las instituciones educativas; se determinó que el 40% de jóvenes desocupados, 28% escolares y el 43.6% estudiantes universitarios consumen dos veces por semana. (Agencia Peruana de Noticias Andina, 2017)

En cuanto a la violencia familiar, considera a América Latina como uno de los países donde más se destaca el movimiento de mujer causante del desarrollo de la legislación sobre violencia doméstica. Hoy en día se han promulgado leyes para condenar la violencia doméstica por parte de compañero íntimo, sin embargo, estos esfuerzos no han sido combinados con iniciativas en busca de resolver dicho problema.

En los países de la región de América Latina como Argentina y Brasil carecen de encuesta sobre violencia doméstica, siendo las mujeres víctima de violencia en países como América Latina, entre el 7% y el 25% de mujeres que han tenido pareja han sufrido de violencia física, el 3% y el 7% indicaron haber sufrido a violencia sexual. Las tasas de violencia física van del 8% al 52% en Nicaragua y Estado Plurinacional de Bolivia respectivamente y un 28% del porcentaje correspondiente en los distintos países. La tasa de mujeres víctima de violencia sexual por parte de un compañero íntimo supera a los 11% en comparación de las mujeres con pareja. La razón de estas causas se debe a que en la actualidad no existe medidas estandarizadas para la violencia, ni hay aprobación sobre como establecer medidas para una conducta desagradable y el abuso (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2017).

La encuesta realizada por la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (como se citó en UNICEF, et al. 2019, pp. 1–4) , más del 80% de niños/as y adolescentes son víctima de violencia tanto física, verbal y psicológica en su propio hogar. Mientras que el 45% de adolescentes han sido víctima de violencia sexual con o sin contacto. El problema es a diario y peor aún esto se está normalizando, siendo considerado como un medio para corregir a los hijos, como algo justificable; es así que el 48% de niños y niñas justifican la violencia en sus hogares, indicando el 70% que son maltratadas porque desobedecen a sus padres, el 24% hacen cosas prohibidas, el 18% falta el respeto a sus padres y el 10% saca malas notas, de esta manera ellos cuestionan la violencia que hay en sus hogares. Asimismo la práctica de crianza violentas se han transmitidas en generación en generación, ya que muchos de ellos han sido violentados en su infancia.

En el contexto actual en el que vivimos previo a la declaratoria de emergencia ante la presencia del COVID-19, el “Programa Nacional Aurora”, evidenció que entre el mes de enero a marzo del 2020 se atendieron un total de 12,014 casos a nivel nacional sobre

violencia a niños y adolescentes, siendo del total de atendidos por sexo el 36% hombres y 64% mujeres. Según el tipo de violencia los 2638 casos por violencia sexual de estos 1,018 son contra niños y adolescentes. Esta información estadística nos muestra que la violencia hacia los niños y adolescentes se viene agravando mas aun en el contexto actual en la que vivimos hoy en día donde debido a la condiciones de la cuarentena (como se citó en Defensoría del Pueblo, 2020)

Por otro lado, el alcoholismo, en las zonas rurales u otros lugares del Distrito de Villa el Salvador, se han registrado numerosos casos de alcoholismo es una zona crítica, a consecuencia de la ingesta en grandes cantidades que propicia el incremento de delitos de violencia familiar y también contra la vida el cuerpo y la salud, sobre todo en las zonas rurales donde ha aumentado este problema.

Debido a esta situación problemática ya planteada, se planteó la siguiente el siguiente enunciado: ¿Existe relación entre el consumo de alcohol y la violencia familiar en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020?

Para dar respuesta al enunciado del problema se tiene como objetivo general:

- Determinar la relación entre consumo de alcohol y la violencia familiar en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020.

Para dar respuesta al objetivo general se hace necesario conocer los objetivos específicos:

Describir el nivel de consumo de alcohol en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020.

Describir el nivel de violencia familiar en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020.

Describir el nivel de consumo de alcohol en su dimensión riesgo de alcohol en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020.

Describir el nivel de consumo de alcohol en su dimensión síntoma de dependencia en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020.

Describir el nivel de consumo de alcohol en su dimensión consumo perjudico en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020.

La investigación se justifica de manera teórica ya que se busca crear conocimiento acerca de las variables estudiadas que servirán como sustento a futuras investigaciones y así mismo para comprender la realidad en que viven los pobladores de la avenida Pastor Sevilla.

A nivel práctico, los resultados servirán como referencia para la población le público en general de la Avenida Pastor Sevilla siendo así mismo un referente a las autoridades de dicho distrito, para que puedan tener conocimiento y a partir de esto puedan proponer programas preventivos para erradicar la violencia familiar a causa del consumo de alcohol.

A nivel social, este trabajo de investigación servirá de ayuda para el investigador siendo motivo de investigación y de enriquecimiento, para los adolescentes y padres de familia de la Avenida Pastor Sevilla ya que por medio de esta investigación podrán tener conocimiento del mal que está invadiendo en muchos hogares siendo causa de maltratos tanto físico, verbal y psicológicos.

A nivel metodológico, esta investigación aporta un instrumento adecuado a la situación problemática en la que se vive en la actualidad, necesarios para la recolección de datos. Así mismo estos datos se arriban a resultados válidos y confiables.

El trabajo de investigación tiene como hipótesis general: Existe relación entre consumo de alcohol y la violencia familiar en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020.

Para contrastar la hipótesis se siguió un diseño no experimental descriptivo relacional; teniendo como población a 200 adolescentes de la Avenida Pastor Sevilla, del distrito Villa el Salvador, Lima, 2020.

Para determinar el tamaño de la muestra se consideró trabajar con un muestreo no

probabilístico por cuotas, que consistió en establecer una muestra que involucre a personas que pertenecen a una población, eligiéndose de acuerdo con sus rasgos o cualidades. muestreo tipo aleatorio simple tomando como muestra 30 adolescente Villa el Salvador, Lima 2020.

Para el procesamiento de datos se empleó el programa estadístico SPSS v25 y el programa informático Microsoft Excel 2010. Para el estudio de los datos se utilizó las técnicas de análisis descriptivo, como el uso de tablas de distribución de frecuencias porcentuales y figuras, también se empleó la prueba no paramétrica de Spearman.

Los resultados mostraron un nivel de consumo de alcohol sin riesgo apreciable con una violencia familiar muy baja (15.5%), un nivel de consumo de alcohol sin riesgo apreciable (53.3%), nivel de violencia familiar muy baja (96,7) así mismo en su dimensión riesgo de alcohol sin riesgo apreciable (100%), dimensión síntoma de dependencia un nivel sin riesgo apreciable (96,7%), en su dimensión riesgo de alcohol un nivel sin riesgo apreciable (100%) y en su dimensión consumo perjudicial sin riesgo apreciable (76,7%).

Para concluir que, no existe relación entre consumo de alcohol y la violencia familiar en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020 con una Significación asintótica bilateral = 0,241 y siendo este valor mayor a la medida α de 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, concluyendo que no existe relación entre la relación entre consumo de alcohol y la violencia familiar en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020.

1. Revisión de la literatura

1.1 Antecedentes

1.1.1. Nacional

Sánchez y Navarro (2018), realizaron sus estudios que tiene como título Violencia familiar y consumo de alcohol en los estudiantes de la Institución Educativa N° 0094 del Distrito de La Banda de Shilcayo, Tarapoto, cuyo objetivo fue examinar la relación existente entre la violencia a familiar y consumo de alcohol, cuya metodología utilizada fue diseño no experimental, de corte transversal, donde se utilizaron una muestra de 302 estudiantes entre hombres y mujeres entre los 11 a 18 años de edad del nivel secundaria con indicadores de violencia familiar, a quienes se les aplicaron los instrumentos un cuestionario de violencia familiar adaptado por el autor Cépeda, Moncada y Álvarez (2007) y el cuestionario AUDIT (2001), donde se encontró que, no existe relación significativa entre violenciar familiar y el consumo del alcohol ($p= 0.083$).

1.1.2. Local

Torres (2015), realizo su investigación que tiene como título “Violencia familiar y su relación con el Rendimiento escolar de los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 5027 Arturo Timorán - La Perla Callao, tuvo como objetivo determinar la relación entre las variables Violencia Familiar y Rendimiento Escolar. Su metodología fue de tipo descriptivo correlacional transversal, de enfoque hipotético deductivo y de tipo básico, donde se utilizó una muestra de 242 estudiantes, a quienes se les aplicaron la técnica de la encuesta y Registro de notas; para rendimiento escolar y el instrumento para medir la Violencia familiar que fue adaptado de Cabanillas y Torres (2013), donde se encontró una significativa correlación negativa moderada entre las variables

mediante el coeficiente de correlación de Spearman y el valor calculado es $r = -0,427$ y p -valor = 0,001.

Soria y Vilela (2018), realizaron una investigación que tiene como título Relación entre la Resiliencia y Alcoholismo en el colegio de 6062- PERÚ - EE. UU Villa El Salvador, tuvo como objetivo establecer la relación entre resiliencia y alcoholismo en estudiantes de secundarias, cuya metodología empleada fue tipo cuantitativo, no experimental de corte transversal, donde utilizo una muestra de 737 alumnos del primero a quinto de secundaria, a quienes se le aplicaron la Escala de Resiliencia de Connor y Davidson (2017) para medir las conductas resilientes, de manera temprana y el cuestionario de identificación de los trastornos debido al consumo de alcohol (AUDIT), donde se encontró una relación significativa entre la variable Resiliencia y Alcoholismo ($p=0.000$).

Arias, caverro y Torres (2018), realizaron una investigación que tiene como título Violencia familiar relacionado con el consumo de alcohol en adolescentes de 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Abraham Valdelomar N° 4018, Gambeta , tuvo como objetivo, determinar la relación entre violencia familiar y consumo de alcohol en los estudiantes de secundaria de la comunidad de Gambeta en el callao, cuya metodología empleada fue del tipo cuantitativo transversal y diseño no experimental, donde se utilizó una muestra de 38 estudiantes, a quienes se les aplicaron un cuestionario semi estructurado de 20 preguntas, validado por 6 jueces expertos, para medir la violencia familiar y el instrumento del AUDIT, Test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, utilizado para evaluar el nivel del consumo de alcohol, donde se encontró que evidentemente existe información al nivel de correlación significativa entre ambas variables al 5% relación entre ambas variables. Teniendo como resultado que existe relación directa entre ambas variables.

1.2. Bases teóricas de la investigación

1.2.1 Consumo de Alcohol

1.2.1.1. Definición. El alcoholismo es considerado como una enfermedad crónica, caracterizada por una perturbación fundamental del sistema nervioso central, que se manifiesta por un grupo de síntomas y signos corporales que confieren un carácter imperioso al deseo concomitante de ingerir alcohol. En el nivel de la conducta, la enfermedad se manifiesta por un estado de dependencia física, primaria o secundaria, hacia la sustancia. La sintomatología desaparece temporalmente después del consumo de cierta cantidad de alcohol (Marconi como se citó en Naveillan F, 1981, p. 343).

OMS (1981) define el consumo de alcohol como una alteración en el cual poco a poco va deteriorando la salud y su interrelación con los demás.

1.2.1.2. Teorías que explican el consumo de alcohol. Es importante precisar las teorías sistematizadas en la adolescencia, propuesto por Leal (como se citó en Gonzales Mejía, 2018, pp. 23–28)

Teorías psicobiológicas. Estas teorías afirman que existe una perturbación genética del organismo del individuo que le conduce a una situación de insuficiencia que se mejora temporalmente con el consumo de alcohol. Es decir, el origen de un trastorno puede deberse al resultado de carencia biológico, genética, o una alteración cerebral producto del trastorno. Es por eso que el consumo de alcohol compromete todo el organismo de nuestro cuerpo. Para tal explicación, existen las siguientes teorías:

Teoría de la deficiencia nutricional de Mardones y Williams. Quienes indican que las bases neurobiológicas de la adicción, es debido a la carencia de vitaminas esenciales. En la actualidad, se ha descubierto que la clave de todo consumo se debe al reforzamiento y los mecanismos de neuroadaptación.

Teorías Psicológicas. Manifiesta que según el tipo de personalidad del individuo se relaciona un riesgo mayor con el alcoholismo, citándose un ejemplo de que si un adolescente tiene baja autoestima poca, tolerancia, impulsividad, frustración, hiperactividad, depresión, etc. producirá en el individuo la posibilidad de consumir búsqueda bebidas alcohólicas

Teoría biopsicosocial de Erwing (1980) y Moss y Finney (1983). Esta teoría considera la combinación de todos los factores internos, externos, físicos y psicológicos necesarios para entender el problema del alcoholismo. Funcionando algunos como protectores y otros aumentarían el riesgo de caer en la adicción.

1.2.1.3. Tipos de riesgo. Para una explicación más detallada tomamos la propuesta de Marconi (como se citó en Del Sol Padrón et al., 1991).

Según vía de entrada:

Sociocultural. Aquellos que están abarcados en el grupo vulnerable con tolerancia total al alcohol.

Edónico. Aquellos que tienen como motivación principal la búsqueda del placer en el alcohol.

Evasiva. Aquellos individuos que buscan olvidar sus conflictos con el alcohol.

Asertiva. Aquellas personas que toman como excusas el alcohol para evitar cualquier situación de alto grado que no pueda manejar.

Constitucional. Bebedores que recurren a la violencia en ausencia de otros mecanismos.

Sintomática. Aquellos que padecen de alguna enfermedad psiquiátrica antepuesto al alcoholismo y que pueda acarrear al inicio de la adicción.

De recaída. Para aquellas personas que han dejado de beber y corren el riesgo de volver a padecer esa adicción.

Síntoma de Abstinencia. Es dado por las primeras horas que se deja de beber hasta días que presenta síntomas de dependencia física.

1.2.1.4. Dimensiones del consumo de alcohol. El cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol (AUDIT, 2001), desarrollado para revelar el consumo excesivo de alcohol clasificó las dimensiones en:

Consumo de riesgo. Es un patrón que aumenta al mismo tiempo con el consumo adverso para quien lo consumo como para los demás. Este patrón es importante para el sector de salud aun no haya el individuo experimentado ningún trastorno.

Consumo perjudicial. Es todo aquello que conlleva consecuencias para la salud físico, psicológico y sociales, entre otros daños causados por el alcohol.

Consumo de dependencia. Formado por un conjunto de fenómenos conductuales, fisiológicos y cognitivos que aparecer después de la ingesta repetitiva de alcohol, incluyendo como síntoma:

- Deseo intenso por consumir alcohol,
- Dificultad para controlarse en el consumo de alcohol
- Aumento por la pasividad de alcohol

- Abstinencia

12.1.5. Efecto del alcohol en el cerebro. Estudios científicos de Medical University of South Carolina (como se citó en Tendencias Científicas, 2020, p. 2), señalan “El consumo excesivo de alcohol puede reducirse bloqueando uno de los receptores opioides del cerebro, se ha comprobado en ratones. Posible terapia para tratar el alcoholismo en humanos”.

Estos estudios descubrieron una parte del cerebro relacionada con el sistema receptor opioide encontrado en el Sistema Nervioso de los mamíferos, estas drogas pueden ser manipulable para reducir el consumo de alcohol teniendo los mismos efectos que el de una droga.

Sin embargo, existe un receptor llamado Kappa, es opuesto a los demás receptores, conocido como un sistema anti – recompensa que es el causante de provocar la resaca.

Estos estudios han sido llevados a cabo con ratones, a los que desactivaron este receptor mediante medicamento a lo que dio buenos resultados reduciendo significativamente el consumo de alcohol.

Debido a este experimento se ha hecho posible señalar que desactivando estos receptores es posible ser utilizado para disminuir el consumo de alcohol.

1.2.1.6. Consumo excesivo en el adolescente. El alcoholismo además de ser una droga que causa dependencia en las personas siendo una de las causas de más de 60 tipos de distintas enfermedades, podemos decir también que es un problema de social (Anderson et al., 2008, p. 57), ya que con frecuencia las personas que las consume se vuelven adictos, lo cual arrastra muertes innecesarias, el uso de incremento de alcohol mayormente está relacionado con adolescente sin darse cuenta que los daños son más perjudiciales que en los

adultos debido que son más susceptibles al toxico provocando un daño irremediable en su salud, según afirma la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila (2014)

Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo (como se citó en Siqueira Lorena y Vicent C, 2015)

[...] el consumo de alcohol durante este período de crecimiento puede interrumpir procesos claves de desarrollo del cerebro, que pueden dar lugar a deterioro cognitivo y a un riesgo elevado de desarrollar un trastorno crónico de consumo de alcohol.

1.2.2. Violencia familiar

Definición.

La violencia familiar considerada como todo aquel comportamiento indebido que llega a poner en peligro la integridad física o psicológica de las personas o a un grupo familiar, ya sea por medio de chantaje, amenazas, fuerza física o violencia sexual tanto en familia como en el hogar, incluye también el maltrato infantil, incesto, maltrato por parte de las mujeres y abusos sexuales de cualquier índole (Comisión Europea como se citó en Hernández, 2016a, p. 2).

Claramunt (como se citó en Hernández, 2016b, p. 3), la violencia familiar o doméstica se puede como toda acción u omisión resultante de cualquier daño que atente contra la integridad física, sexual, emocional o social en el que se debe intervenir mediante un vínculo familiar o una relación íntima entre el agresor y la víctima.

1.2.2.1. Teorías. Diversas teorías explican el consumo de alcohol (como se citó en Rodríguez Otero, n.d., p. 3)

Teorías biologicistas. Wurtman y Halprin explican esta teoría como una carencia genética, neurotransmisores y hormonales.

Teoría del condicionamiento. Explica que se debe al aprendizaje de distintos tipos de conducta a través de diferentes vías.

Teoría del psicoanálisis, explica la agresividad como algo innato del ser humano y parte de la estructura psíquica de la persona.

Teoría de la “fustración - agresión” (Dollard, Espinoza, Berkowitz y Naori).

Teoría de las habilidades sociales. La agresión se debe a una pérdida de señales sociales.

Teorías miméticas. La violencia se debe a causa del deseo.

Teorías sociológicas. Atribuyen a la violencia a variables de contextos sociales y ambientales.

1.2.2.2. Violencia de género. Este tipo de violencia hace referencia a la violencia que son ejercidas en contra de las mujeres, una forma discriminante de desigualdad y relaciones de poder ejercida por el varón sobre la mujer. (Fernández como se citó en Rodríguez, 2013a, p. 3). Así mismo identifican esta violencia como cualquier un acto violento que se da contra la mujer discriminándola por su género, puede que sea resultado de daño físico, sexual o psicológico y abarca todo tipo de violencia. citado (Mirat y Armenudariz como se citó en Rodríguez, 2013b, p. 3)

Tipos de violencia. El Observatorio contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (2021), considera como tipos de violencia:

- **Violencia física.** Es la conducta que causa daño corporal y físico a la salud del individuo. Siendo considerado el maltrato todo tipo de descuido, privación a

las necesidades básicas que causen daño físico o que pueda ocasionarlo sin importar el tiempo de su recuperación.

- **Violencia psicológica.** Es toda conducta que pueda realizar un individuo con el fin de daño psicológicamente al individuo como: gritos, amenazas, humillación, etc.
- **Violencia sexual.** Son acciones de naturaleza sexual que se comete contra un individuo sin su consentimiento o coacción. Incluye también actos que no implica penetración, considerando también aquellos actos de exposición o material sexual pornográfico que viola los derechos de la persona.
- **Violencia económica.** Es considerado en caso de que las mujeres tengan hijos se considera como la privación de los medios indispensables para que el individuo pueda vivir una vida digna, así como la evasión de la pensión alimenticia por parte de la pareja.

1.2.3. Adolescente

UNICEF (2020) define la adolescencia como “La adolescencia es una etapa necesaria e importante para hacernos adultos. Pero esencialmente es una etapa con valor y riqueza en sí misma, que brinda infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas”. esta etapa es muy desafiante para muchos adolescentes, a su vez para los padres y adultos cercanos que le rodean, donde se encuentran sumergidos en una serie de conflictos en busca de su identidad, manifestándose en su comportamiento y actuar.

2. Hipótesis

- **H1:** Existe relación entre consumo de alcohol y la violencia familiar en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020.
- **H0.** No existe relación entre consumo de alcohol y la violencia familiar en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020.

3. Método

3.1. El tipo de investigación

Este tipo de investigación será cuantitativo ya que se recogerá los datos obtenidos para probar las hipótesis ya establecidas. (Roberto y Sampieri, 1997).


3.2. Nivel de la investigación

El nivel de investigación será relacional porque se analizarán las cualidades de las variables y no se hará un mayor análisis estadístico. (Tamayo y Tamayo, s.f.).

3.3. Diseño de la investigación

El diseño no experimental, no realiza control ni manipula sus variables para su estudio, (Espinosa, 2016). Solo se medirá las variables en dicha muestra, no manipular las variables. Así mismo según Hernández, Fernández Y Baptista (2014) este estudio es un diseño transversal ya que se recolectarán los datos en un único y momento determinado.

En un esquema:



Donde:

M: muestra de adolescente

O1: Observación de la variable Consumo familiar.

O2: Observación de la variable violencia familiar.

r: relación entre las variables.

3.4. El Universo, población y muestra

Universo

La población se puntualiza como la totalidad del fenómeno a estudiar y posee una característica común la cual es estudiada y da origen a datos de investigación. (Tamayo, 2011)

En este sentido el universo del proyecto de investigación está compuesto por 1000 adolescentes, del distrito de Villa el salvador, Lima 2020.

Población

Desde el punto de vista de Bernal (2006) “la población debe definirse a partir de los términos siguientes: elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo” (Moreno Galindo, 2021)

Muestra

“Universo es el conjunto de elementos a los cuales se quieren inferir los resultados”. (Espinosa, 2016)

Como muestra se tomó a 30 adolescentes de la calle B de la Avenida Pastor Sevilla, quienes cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión:

Criterio de inclusión

- Adolescentes que aceptaron participar en la investigación.
- Adolescentes que pertenezcan a la calle B de la Avenida Pastor Sevilla
- Adolescentes de ambos sexos.

Criterio de exclusión

- Adolescentes que no hayan aceptado participar en la investigación
- Adolescentes que no contestaron la totalidad de los ítems.

3.5. Operacionalización de las variables

VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN	DIMENSIONES / INDICADORES	VALORES FINALES	TIPO DE VARIABLE
Consumo de alcohol	Consumo de riesgo de alcohol Síntomas de dependencia Consumo perjudicial de alcohol	Consumo de alcohol sin riesgo apreciable Consumo en riesgo Consumo perjudicial Consumo dependiente	Categorica, Nominal, Politónica
Violencia familiar	Sin dimensiones	Nivel alto Nivel bajo Nivel muy bajo	Categórica, nominal, politómica

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección datos

3.6.1. Técnica de la encuesta

Las técnicas de encuestas empleadas serán las psicométrica. Ya que es una técnica estandarizada por la cual se recoge información y se analiza un conjunto de datos de la muestra que se pretende describir, analizar, redactar. García Ferrando citado por (Rodríguez U, 2010)

3.6.2. Instrumentos

En la investigación se utilizará los siguientes instrumentos: el primero que es consumo de alcohol se realizará con el cuestionario de preguntas de Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) y para detectar tipos violencia intrafamiliar será realizará mediante un cuestionario realizado por Zavaleta Orbegoso (como se citó en Violeta Elizabeth 2016).

Test de Identificación de Trastornos Relacionados con el Uso del Alcohol.

A. Nombre original de la escala: Test de Identificación de Trastornos Relacionados con el Uso del Alcohol.

B. Autores: Saunders JB, Aasland OG, Babor TF, De La Fuente J, Grant M. (1992)

Cuestionario de violencia familiar

A. Nombre original del cuestionario: Cuestionario de Violencia Familiar

B. Autor: Zavaleta Orbegoso Violeta Elizabeth (2016)

3.7. Plan de análisis

Una vez obtenida los datos recopilados mediante la técnica de encuesta y el instrumento del test AUDIT se realizará a comprobar los datos mediante la estadística y luego comenzaremos a tabular y realizar las tablas y gráficos con el software EXCEL, mediante el grafico de barras.

3.8. Principios éticos

Entre los principios de ética, se utilizará la investigación y principios de ética de la ULADECH. Entre ellas tenemos:

La protección a las personas, libre participación y derecho a estar informado y por último beneficencia no maleficencia. Todo adolescente que acceda a esta investigación está protegido, se garantiza el cuidado de los adolescentes a dañar su integridad. Así mismo los adolescentes estarán informados del objetivo del proyecto mediante sus padres por ser menores de edad y así mismo decidirán por voluntad propia su libre participación. Y por último se buscará el bien de los participantes, buscando concientizar en los estudiantes que el uso de alcohol puede dañar su salud física y psicológicamente así mismo el uso excesivo puede ocasionar violencia familiar. (Quiñones Negrete, 2019, pp. 2–3)

4. Resultados

4.1. Resultados

Tabla 1

Consumo de alcohol y la violencia familiar, en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020

			Sin riesgo apreciable	Consumo en riesgo	Consumo perjudicial	Total
Nivel violencia	Muy baja	f	16	6	7	29
		%	15,5	5,8	7,7	29,0
	Baja	f	0	0	1	1
		%	0,0%	0,0%	12,5%	3,3%
Total		f	16	6	8	30
		%	53,3%	20,0%	26,7%	100,0%

Nota. De la población estudiada la mayoría presenta un nivel de consumo sin riesgo apreciable con violencia familiar muy baja (15.5%).

Tabla 2

Prueba estadística de chi cuadrado

	Valor	gl	Significación asintótica bilateral (p – valor)
Chi- cuadrado de Pearson	2,845 ^a	2	0,241

Nota. En la presente tabla para comprobar la hipótesis planteada, se utilizó la prueba del Chi-cuadrado de independencia, obteniéndose como p valor 2,41%

Tabla 3


Consumo de alcohol, en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020

		f	%
Consumo de Alcohol	Sin riesgo apreciable	16	53,3
	consumo de riesgo	6	20,0
	consumo perjudicial	5	16,7
	consumo dependiente	3	10,0
Total		30	100,0

Nota. De la población estudiada la mayoría presenta un consumo de alcohol sin riesgo apreciable (53,3%).

Figura 1

Gráfico de barras del consumo de alcohol en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020



Nota. De la población estudiada la mayoría presenta un consumo de alcohol sin riesgo apreciable.

Tabla 4


Violencia familiar, en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020

		f	%
Violencia familiar	Muy Baja	29	96,7
	Baja	1	3,3
	Total	30	100,0

Nota. De la población estudiada la mayoría presenta un nivel de violencia familiar muy baja (96,7%).

Figura 2

Gráfico de barras de Violencia familiar, en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020



Nota. De la población estudiada la mayoría presenta un nivel de violencia familiar muy baja.

Tabla 5


Dimensión síntoma de dependencia, en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020

		f	%
Síntoma de dependencia	Sin riesgo apreciable	29	96,7
	consumo de riesgo	1	3,3
	Total	30	100,0

Nota. De la población estudiada la mayoría presenta un nivel de síntoma de dependencia sin riesgo apreciable (96,7%).

Figura 3

Gráfico de barras dimensión síntoma de dependencia en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020



Nota. De la población estudiada la mayoría presenta un nivel de síntoma de dependencia sin riesgo apreciable.

Tabla 6

Dimensión riesgo de alcohol, en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020

Riesgo de alcohol	f	%
Sin riesgo apreciable	30	100,0
Total	30	100,0

Nota. De la población estudiada la mayoría presenta un nivel de riesgo de alcohol, sin riesgo apreciable (100,0%).

Figura 4

Gráfico de barras dimensión riesgo de alcohol, en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020



Nota. De la población estudiada la mayoría presenta un nivel de riesgo d alcohol, sin riesgo apreciable.

Tabla 7


Dimensión consumo perjudicial, en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020

		f	%
Consumo	Sin riesgo apreciable	23	76,7
perjudicial	consumo de riesgo	7	23,3
Total		30	100,0

Nota. De la población estudiada la mayoría presenta un nivel de consumo perjudicial sin riesgo apreciable (76,7%).

Figura 5

Gráfico de barras dimensión consumo perjudicial, en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020



Nota. De la población estudiada la mayoría presenta un nivel de consumo perjudicial sin riesgo apreciable.

Tabla 8*Ritual de significancia estadística***Hipótesis**

Ho: No existe relación entre consumo de alcohol y violencia familiar, en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020

HI: Existe relación entre consumo de alcohol y violencia familiar, en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020

Nivel de significancia

Nivel de significancia (alfa) $\alpha = 5\% = 0,05$

Estadístico de prueba

Prueba Chi cuadrado de independencia.

Valor de P= 0,241= 2,41%

Toma de decisiones

No existe relación entre consumo de alcohol y violencia familiar, en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020.

Nota. En la tabla 2, se empleó la prueba del Chi-cuadrado de independencia,

obteniéndose como p valor 2,41% que está por encima del nivel de significancia del 5%

lo cual permitió la decisión de rechazar la hipótesis de investigación, es decir no existe

relación entre consumo de alcohol en su dimensión consumo perjudicial, en

adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020.

4.2. Discusión

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre Consumo de Alcohol y Violencia Familiar en adolescentes, Villa el Salvador, Lima, en el que se encontró que no existe relación entre ambas variables, esto es a partir de la prueba estadística de Chi-cuadrado de independencia, de la cual se calculó el p valor 2,41% , que se encuentra por arriba del nivel de significancia del 5%, lo cual nos permitió rechazar la hipótesis de investigación y admitir la hipótesis nula, evidenciándose que no existe relación entre ambas variables consumo de alcohol y violencia familiar.

Este resultado garantiza su validez interna, ya que los resultados recogidos a través de los cuestionarios que cuentan con propiedades métricas, siendo los instrumentos validados y confiables a nivel local. Utilizando como instrumentos el Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (2001), adaptado en Perú obteniéndose una validez de 0.87 y el Cuestionario para detectar tipos violencia intrafamiliar en Adolescentes que fue validado en el Perú (Arias Alcides et al., 2018), obteniéndose una validez de 0,7. en lo que cuenta a su validez externa, podemos indicar que los resultados pueden ser generalizados, dado el cuidado de la validez interna y por tratarse de un estudio relacional.

El interés de nuestra investigación se centró en demostrar la relación entre las variables mencionadas, en tanto el consumo de alcohol puede generar graves problemas de salud tanto físico como psicológico.

Como objetivo general se planteó determinar la relación entre el consumo de alcohol y la violencia familiar adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020, los resultados se ven expuestos en la tabla 1, la cual describe la relación de las variables de estudio, misma que se pretender aceptar la hipótesis nula: No existe relación significativa entre Consumo de Alcohol y Violencia Familiar en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020, lo que nos da a conocer que dichos adolescentes, no tienen un nivel de consumo de alcohol perjudicial para

su salud ni dependencia al alcohol, siendo su consumo no tan excesivo que no conlleva a la violencia familiar. Esto concuerda con lo obtenido por Sánchez y Navarro (2018) que realizaron una investigación con los estudiantes de la Institución Educativa N° 0094 del Distrito de La Banda de Shilcayo, Tarapoto, donde se encontró que no existe relación significativa entre violencia familiar y el consumo del alcohol ($p= 0.083$).

En cuanto al nivel de consumo de alcohol en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020, los resultados se ven expuestos en la tabla 3, donde se conoce que el nivel de consumo de alcohol en los adolescentes es de 53,3% con un nivel de consumo sin riesgo apreciable, eso nos demuestra que dichos adolescentes consumen de manera moderada sin tener ningún tipo de riesgo en su consumo. Estos valores concuerdan con Barrientos y Vilela (2018), donde encontró un 65,8%, de nivel de consumo de alcohol sin riesgo apreciable

Según la ONS, considera el consumo de alcohol como una alteración en el cual poco a poco va deteriorando la salud o como la persona de desarrolla con los demás por un tiempo determinado.

En cuanto al nivel de violencia familiar, se conoce que el nivel de violencia familiar es de 96,7% en un nivel muy bajo, eso nos demuestra que los adolescentes no se desarrollan en un ambiente con violencia. Estos datos no concuerdan con Torres (2015), donde encontró los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 5027 Arturo Timorán - La Perla Callao un 39,3%. Estos datos pueden deberse al ambiente que perciben dichos estudiantes, donde abunda un ambiente familiar con amor, respeto y cariño el nivel de violencia será muy bajo a diferencia de un ambiente donde perciben la violencia en sus integrantes.

La ONS define la violencia como el uso de fuerza o poder contra uno mismo o contra otra persona que cause o tenga la posibilidad de causar lesione, ofensas o daños emocionales. Citado por (Sarabia, 2018)

En cuanto al consumo de alcohol en su dimensión síntoma de dependencia, se observa que el 96,7% de adolescente perciben un consumo de alcohol sin riesgo apreciable. Estos valores concuerdan con Soria y Vilela (2018), donde presentan un nivel sin riesgo apreciable de 81,0%. Esto nos demuestra que, dichos adolescentes no presentan ningún síntoma de dependencia al alcohol, es decir su consumo no es de forma excesiva y habitual durante tiempo prolongado.

Según el manual del AUDIT, la dependencia es un conjunto de respuesta conductuales que suelen aparecer después del consumo repetitivo de sustancias alcohólicas, manifestándose como un fuerte deseo de consumir alcohol, a pesar de las graves consecuencia que traiga. Así mismo tiene como síntomas la abstinencia física, la intolerancia, cuando se interrumpe el consumo.

En cuanto al consumo de alcohol en su dimensión riesgo de alcohol, se conoce un nivel de consumo de alcohol sin riesgo apreciable al 100%. Esto demuestra que el consumo de alcohol que ingieren dichos adolescentes no es apreciable a tal modo que, pueda poner en riesgo su salud o la de los demás. Estos datos concuerdan con Barrientos y Vilela (2018), donde encontró en los estudiantes adolescentes de secundaria de la Institución Educativa 6062- Perú- EE. UU de Villa el Salvador, Lima, un nivel de consumo de alcohol en un 79,8% sin riesgo apreciable.

Según el manual AUDIT, el consumo de riesgo es un esquema de consumo de alcohol que aumenta con el riesgo de consecuencias adversas para el bebedor o para los demás. Los patrones de consumo de riesgo son importantes para la salud pública a pesar de que el individuo aún no haya experimentado ningún trastorno.

En cuanto al consumo de alcohol en su dimensión consumo perjudicial, se observa que el 76,7% presentan un nivel sin riesgo apreciable. Esto demuestra que dichos adolescentes no presentan un consumo perjudicial de tal modo que puedan traer su consumo

pueda tener grave consecuencia en su salud física como mental. Estos datos concuerdan con Soria y Villela (2018), presenta un nivel de alcoholismo según su dimensión consumo perjudicial de alcohol un 61,9% sin riesgo apreciable. Estos datos demuestran que los adolescentes presentan un nivel consumo no perjudicial sin riesgo apreciable, es decir los adolescentes no presentan ningún deterioro en su salud por culpa del alcohol así mismo manifiestan no sentirse culpables tras haber consumido.

El consumo perjudicial según el Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT) se describe a aquel que trae consigo una serie de problemas de salud física como mental que repercutan en su actuar.

5. Conclusiones

- No existe relación entre el consumo de alcohol y la violencia familiar en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020.
- El nivel de consumo de alcohol arroja un 53,3% sin riesgo apreciable.
- El nivel de violencia familiar arroja un 96.7% en un nivel muy baja.
- En su dimensión síntoma de dependencia, arroja un 96,7%, sin riesgo apreciable.
- En su dimensión riesgo de alcohol, arroja un 100,0% sin riesgo apreciable.
- En su dimensión consumo perjudicial, arroja un 76,7% sin riesgo apreciable
-

Referencias

- Agencia Peruana de Noticias Andina. (2017). *Cedro: más de un millón 700 mil peruanos son adictos al alcohol*. <https://andina.pe/agencia/noticia-cedro-mas-un-millon-700-mil-peruanos-son-adictos-al-alcohol-691444.aspx>
- Anderson, P., Gual, A., y Colón, J. (2008). *Alcohol y atención primaria de la salud Alcohol y atención primaria de la salud*. Organización Panamericana de la Salud.
<https://doi.org/10.4067/S0718-85602009000300014>
- Arias Alcides, K. G., Cavero Bustamante, S. B., y Torres Ruda, L. M. (2018). *Violencia familiar relacionado con el consumo de alcohol en adolescentes de 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Abraham Valdelomar N° 4018 en la comunidad de Gambeta - Callao 2018*. Universidad Nacional Del Callao.
http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/4305/arias_alcides%2C_cavero_bustamante_y_torres_ruda_titulo_profenfermeria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Babor, T. F., Higgins Biddle, J. C., Saunders, J. B., y Monteiro, M. G. (2001). Cuestionario de Identificación de los Transtornos debidos al Consumo de Alcohol. *AUDIT*, 6, 1–40.
http://www.who.int/substance_abuse/activities/en/AUDITmanualSpanish.pdf
- Defensoría del Pueblo. (2020). *La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19*.
<https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Serie-Informes-Especiales-N-007-2020-DP-Violencia-contraniñas-niños-y-adolescentes-en-el-contexto-de-la-emergencia.pdf>
- Del Sol Padrón, L. G., Alvarez Fernandez, O. M., y D Rivero Berovides, J. (1991). Consumo de Alcohol. *Revista Científica Medica de Ciefuegos*, 10, 1–2.
<http://www.eltabacoapesta.com/otras-drogas/alcohol/efectos-del-alcohol/>

Espinosa, E. (2016). *Universo, muestra y muestreo*.

<http://www.bvs.hn/Honduras/UICFCM/SaludMental/UNIVERSO.MUESTRA.Y.MUESTREO.pdf>

Gonzales Mejía, M. del C. (2018). *Consumo de alcohol en alumnos del 4° año de secundaria de la Institución Educativa Mercedes Indacochea Lozano, Huacho - 2018*. 32–34.

<http://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/UNJFSC/3611/TESIS-MARIA-GONZALES-30.05.19.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Hernández, M. (2016). Término crimipedia: Violencia intrafamiliar. *Crimina*, 18.

<http://crimina.es/crimipedia/wp-content/uploads/2016/10/Violencia-intrafamiliar.-Juan-Ruiz-Varea.pdf>

Huayanay Bullon, E., y Quispe Ramon, N. (2018). *Clima social familiar y estrategia de afrontamiento al estrés en adolescentes de una Institución Educativa Pública secundaria Huanuco - 2018* [Universidad Nacional Hermilio Valdizan].

<http://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/UNHEVAL/4500/TPS255H82.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Moreno Galindo, E. (2021). *Metodología de investigación, pautas para hacer tesis*. 2002, 1–

5. <https://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.com/2013/08/que-es-la-poblacion.html>

Naveillan F, P. (1981). Sobre el concepto de alcohol. *Alcoholismo*, 91(4), 340–348.

<https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/17162/v91n4p340.pdf?sequence=1>

Observatorio contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. (2021). *Tipos de violencia*. <https://observatorioviolencia.pe/tipos-de-violencia/>

Pérez de Corcho, M. A., Mármol Soñora, L., García Díaz, G., Viscay Castilla, M., y Tomé

López, M. de las M. (2014). *Consecuencias sociales que produce el incremento del consumo de alcohol en adolescentes*. 20.

<http://www.revmediciego.sld.cu/index.php/mediciego/article/view/36/331>

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2017). *Comparación de las políticas sobre violencia doméstica en América Latina: penalización, empoderamiento de víctimas y rehabilitación de agresores*.
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/womens_empowerment/cuaderno-3---comparacion-de-las-politicas-sobre-violencia-domest.html
- Quiñones Negrete, M. (2019). *Código de Ética para la Investigación Universitaria* (pp. 2–3). Universidad Católica los Angeles de Chimbote.
- Roberto, M. C., y Sampieri, H. (1997). *Metodología de la investigación* (Primera Ed).
- Rodríguez Otero, L. M. (2013). La Violencia. “Definición, Fundamentación y Clasificación de La Violencia,” 9(1), 3–4. <https://doi.org/10.1558/jsrnc.v4il.24>
- Rodríguez U, M. L. (2010). Metodologías de la investigación. *La Técnica de La Encuesta*, 1–11.
- Sánchez Escribano, A. (2019). *Por ser legales, ¿son las drogas menos perjudiciales?* Blog Quirónsalud. <https://www.quironsalud.es/blogs/es/psicologia-salud/legales-drogas-menos-perjudiciales>
- Sánchez Torres, A. O., y Navarro Portocarrero, R. (2018). *Violencia familiar y consumo de alcohol en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 0094 del distrito de la banda de shilcayo, 2017 (Tesis de Licenciatura)* [Universidad Peruana Unión].
https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/1042/Roby_tesis_Bachiller_2018.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Sarabia, S. (2018, March). Violencia: una prioridad de la salud pública. *Revista de Neuro-Psiquiatría*, 81(1), 1. <https://doi.org/10.20453/rnp.v81i1.3267>
- Siqueira Lorena, y Vicent C, S. (2015, October 26). Consumo excesivo de alcohol en adolescentes. *IntraMed*, 8.

<https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=87908>

Soria Barrientos, C. R., y Vilela Almeida, S. C. (2018). “ *Resiliencia y alcoholismo en adolescentes de secundaria de la institución educativa 6062- Perú - EE.UU de Villa el Salvador, Lima – 2018 .*” Universidad Privada Norbert Wiener Facultad.

[http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2772/TESIS_Soria Carmen - Vilela Sandy.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2772/TESIS_Soria_Carmen_-_Vilela_Sandy.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Tamayo, T. (2011). Tesis de Investigación. *Poblacion y Muestra*, 240.

<http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/poblacion-y-muestra-tamayo-y-tamayo.html>

Tamayo y Tamayo, M. (n.d.). *Tipos de Investigación*. 1–23.

[http://trabajodegradoucm.weebly.com/uploads/1/9/0/9/19098589/tipos_de_investigacion .pdf](http://trabajodegradoucm.weebly.com/uploads/1/9/0/9/19098589/tipos_de_investigacion.pdf)

Tendencias Científicas. (2020, May). El abuso del alcohol puede corregirse manipulando el cerebro. *La Dimensión Humana de La Ciencia. La Dimensión Científica de Lo Humano*.

https://www.tendencias21.net/El-abuso-del-alcohol-puede-corregirse-manipulando-el-cerebro_a45846.html

Torres Medina, L. (2015). Violencia familiar y su relación con el rendimiento escolar de los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 5027 Arturo Timorán - La Perla Callao, 2015 [Universidad Cesar Vallejo]. In *Universidad César Vallejo*.

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/14848/Torres_ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UNICEF, MINEDU, M. (2019). *Cifras de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes en el Perú*. [https://www.unicef.org/peru/sites/unicef.org/peru/files/2019-09/cifras-](https://www.unicef.org/peru/sites/unicef.org/peru/files/2019-09/cifras-violencia-ninas-ninos-adolescentes-peru-2019.pdf)

[violencia-ninas-ninos-adolescentes-peru-2019.pdf](https://www.unicef.org/peru/sites/unicef.org/peru/files/2019-09/cifras-violencia-ninas-ninos-adolescentes-peru-2019.pdf)

UNICEF. (2020). Qué es la adolescencia? *La Adolescencia*, 10–19.

<https://www.unicef.org/uruguay/que-es-la-adolescencia>

World Health Organization. (2018). Global status report on alcohol and health 2018. In

Global status report on alcohol (Vol. 65, Issue 1). <https://doi.org/10.1037/cou0000248>

Apéndice

Apéndice A. Instrumentos de evaluación



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA



Test de Identificación de Trastornos por consumo de alcohol: versión de auto-pase.					
<small>PACIENTE: Debido a que el uso del alcohol puede afectar su salud e interferir con ciertos medicamentos y tratamientos, es importante que le hagamos algunas preguntas sobre su uso del alcohol. Sus respuestas serán confidenciales, así que sea honesto por favor. Marque una X en el cuadro que mejor describa su respuesta a cada pregunta.</small>					
Preguntas	0	1	2	3	4
1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica?	Nunca	Una o menos veces al mes	De 2 a 4 veces al mes	De 2 a 3 más veces a la semana	4 o más veces a la semana
2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de consumo normal?	1 o 2	3 o 4	5 o 6	De 7 a 9	10 o más
3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
4. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de parar de beber una vez había empezado?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
8. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
9. ¿Usted o alguna otra persona ha resultado herido porque usted había bebido?	No		Sí, pero no en el curso del último año		Sí, el último año
10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por un consumo de bebidas alcohólicas o le ha sugerido que deje de beber?	No		Sí, pero no en el curso del último año		Sí, el último año
					Total

Cuestionario de violencia familiar

Instrucciones: Se pide resolver el cuestionario sin omitir ninguna pregunta y con total sinceridad.

Recordar: Responder marcando dentro del paréntesis.

Preguntas.

1. ¿Has sufrido en algún momento violencia o maltrato en tu hogar? Si () No ()
2. ¿Qué tipo de violencia has recibido en tu hogar? Física () Verbal () Psicológica ()
3. ¿Cómo te sientes como hijo junto a tus padres o familiares?: Protegido ()

Desprotegido ()

4. ¿Con que frecuencia sufres de violencia o maltrato en tu hogar? Diariamente () A la semana () Al mes () Nunca ()
5. ¿La relación que tienes con tus padres es mala? Si () No ()
6. ¿Tus padres te golpean? (puñetes, patadas, jalones, empujones, etc.)
Si () No ()
7. ¿Recibes maltrato por parte de otros integrantes de tu familia? Si () No ()
8. ¿Con que frecuencia hay peleas o maltratos dentro de tu hogar? Si () No ()
9. ¿Tus padres, tíos o abuelos te insultan, te agreden verbalmente amenazan? Si () No ()
10. ¿Tus hermanos te maltratan dentro de tu hogar? Si () No ()
11. ¿Tus padres o familiares te maltratan por tus calificaciones? Si () No ()
12. ¿Tus padres o familiares te humillan en público? Si () No ()
13. Cuando tus padres te dan una orden, ¿te gritan y amenazan? Si () No ()
14. Cuando hay problemas económicos en tu casa, ¿tus padres te maltratan?
Si () No ()
15. ¿Tus hermanos son maltratados dentro de tu hogar? Si () No ()
16. ¿Tus padres se maltratan entre sí, en tu presencia? Si () No ()
17. ¿Tus padres o familiares te maltratan cuando haces alguna cosa equivocadamente?
Si () No ()
18. ¿Cuándo hay algún problema en tu casa, te maltratan a ti y a tus hermanos?
Si () No ()
19. ¿Alguien de tu familia te insulta y grita constantemente? Si () No ()
20. ¿Tus padres o familiares te pegan delante de otras personas? Si () No ()



Apéndice B. Consentimiento informado

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA



CONSENTIMIENTO INFORMADO

02 de setiembre de 2020

Estimado

La Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote apoya la práctica de obtener el consentimiento informado de, y proteger a, los sujetos humanos que participen en investigación.

La siguiente información tiene por objeto ayudarle a decidir si aceptará participar en el presente estudio. Usted está en libertad de retirarse del estudio en cualquier momento.

Para tal efecto se le pedirá que responda al Cuestionario de Identificación de los Transtornos debidos al Consumo de Alcohol y violencia familiar. Nos interesa estudiar el Consumo de alcohol y la violencia familiar, en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020. Nos gustaría que usted participara de esta investigación, pero tal participación es estrictamente voluntaria.

Les aseguramos que su nombre no se mencionará en los hallazgos de la investigación. La información sólo se identificará mediante un código numérico.

Si le gustaría tener información adicional acerca del estudio antes o después que finalice, puede ponerse en contacto con cualquiera de nosotros por teléfono o por correo.

Agradecemos su atención y apreciamos su interés y cooperación.

Atentamente,

Arontinco Velasquez Norma Antonia
 Estudiante de psicología de la ULADECH Católica
[Norma arotincovelasquez@gmail.com](mailto:Norma_arotincovelasquez@gmail.com)

Apéndice C. Cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																	
N°	Actividades	2020				2020				2021				2021			
		2020 – 01				2020 - 01				2021 – 01				2021 – 02			
		Mes				Mes				Mes				Mes			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Elaboración del Proyecto	X	X	X													
2	Revisión del proyecto por el jurado de investigación			X													
3	Aprobación del proyecto por el Jurado de Investigación			X													
4	Exposición del proyecto al Jurado de Investigación			X													
5	Mejora del marco teórico y metodológico				X	X											
6	Elaboración y validación del instrumento de recolección de datos						X	X									
7	Elaboración del consentimiento informado (*)								X								
8	Recolección de datos									X							
9	Presentación de resultados										X						
10	Análisis e Interpretación de los resultados											X					
11	Redacción del informe preliminar												X				
12	Revisión del informe final de la tesis por el Jurado de nvestigación													X			
13	Aprobación del informe final de la tesis por el Jurado de Investigación														X		
14	Presentación de ponencia en jornadas de investigación															X	
15	Redacción de artículo científico																X

Apéndice D. Presupuesto

Presupuesto desembolsable (Estudiante)			
Categoría	Base	% o Número	Total (S/.)
Suministros (*)			
Impresiones	0.30	100	30.00
Fotocopias	0.05	500	25.00
Empastado	30.00	1	30.00
Papel bond A-4 (600 hojas)	0.05	600	30.00
Lapiceros	0.30	30	9.00
Servicios			
Uso de Turnitin	50.00	2	100.00
Sub total			224.00
Gastos de viaje			
Pasajes para recolectar información	2.30	10	23.00
Subtotal			
Total de presupuesto desembolsable			247.00
Presupuesto no desembolsable (Universidad)			
Categoría	Base	% o Número	Total (S/.)
Servicios			
Uso de Internet (Laboratorio de Aprendizaje Digital – LAD)	30.00	4	120.00
Búsqueda de información en base de datos	35.00	2	70.00
Soporte informático (Módulo de Investigación del ERP University – MOIC).	40.00	4	160.00
Publicación de artículo en repositorio institucional	50.00	1	50.00
Sub total			
Recurso humano			
Asesoría personalizada (5 horas por semana)	63.00	4	252.00
Subtotal			252.00
Total de presupuesto no desembolsable			652.00
Total (S/.)			899.00

Apéndice E. Ficha técnica del instrumento de evaluación

1. CUESTIONARIO DE CONSUMO DE ALCOHOL

El cuestionario de Identificación de los Trastornos debido al consumo de alcohol (AUDIT) Desarrollado por la OMS y validado por el Ministerio de Salud, comprende 10 ítems que se responden en una escala desde 0= nunca, 1= menos de una vez al mes, 2= mensualmente, 3= semanal y 4= a diario o casi a diario.

El constructo se compone de 3 Dimensiones: Dimensión consumo de riesgo de alcohol consta del ítems: 1,2 y 3; dimensión síntomas de dependencia consta del ítems 4, 5 y 6; dimensión consumo perjudicial de alcohol consta del ítems 7, 8, 9 y 10. Al finaliza se evalúa la puntuación de cada dimensión y se interpreta que a mayor puntuación en cada dimensión, mayor indicador de presentar algún trastorno debido al consumo de alcohol en la persona (35). Puntuación Resultados De 0 a 7 Consumo de alcohol sin riesgos apreciables. De 8 a 15 Consumo en Riesgo donde se puede realizar intervenciones preventivas. De 16 a 19 Consumo perjudicial donde se realiza examen médico, intervención terapéutica y preventiva. De 20 a 40 Consumo dependiente orientada hacia un problema mayor con el alcohol a un grado de compromiso y severidad. Se indica intervención terapéutica o referencia a tratamiento en nivel de especialidad.

En relación a la validez y confiabilidad del Instrumento de Identificación de los Trastornos debido al consumo de alcohol (AUDIT) fue aplicado por Llutari Solano Gema y Mendoza Paucar Yeny en el año 2014 (50), titulado “Formación de conducta codependiente en estudiantes de padres alcohólicos del tercero- secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla-El Tambo- Huancayo”, sometido a validez externas a través de juicio 65 de expertos por parte del área de Medicina Psiquiátrica, psicología y enfermería, con un Alfa de Cronbach de 0,66 ($\alpha > 0,6$), lo que confirma la consistencia interna del instrumento y su fiabilidad. Por ello también se realizó las siguientes pruebas el cual arrojó un coeficiente

mayor a 0,5 ($KMO = 0,892$). Así mismo, el coeficiente obtenido por la prueba de esfericidad de Bartlett es de 0,000 ($p < 0,05$). Ambas pruebas confirman la hipótesis de validez del instrumento. El índice Alfa de Cronbach del instrumento es de 0,802 ($\alpha > 0,6$), lo que confirma la consistencia interna del instrumento y su fiabilidad.

2. CUESTIONARIO DE VIOLENCIA FAMILIAR

Cuestionario de violencia familiar Para evaluar la confiabilidad de la encuesta, se realizó a través de una prueba piloto con 15 participantes.

Valores designados

Preguntas 1, 5, 6, 7, 9 hasta 20

Alternativa	Valores
No	0
Sí	1

Pregunta 2

Alternativa	Valores
Ninguna	0
Verbal	1
Psicológica	2
Física	3

Pregunta 3

Alternativa	Valores
Protegido	0
Desprotegido	1

Pregunta 4

Alternativa	Valores
Nunca	0
Al mes	1
A la semana	2

Pregunta 8

Alternativa	Valores
Nunca	0
Al mes	1
A la semana	2
Diariamente	3

La prueba de Alpha de Cronbach sirve para medir la confiabilidad del instrumento, en el cual se demuestra una concordancia entre lo preguntado y las posibles respuestas formuladas. Rangos o niveles de confiabilidad

Muy baja	Baja	Regular	Aceptable	Elevada
0.0 - 0.20	0.21 - 0.40	0.41 - 0.60	0.61 - 0.80	0.81 - 100



0% de confiabilidad en la medición

100% de confiabilidad en la medición.

(No hay error)

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de preguntas
,880	20

Resumen de procesamiento de casos			
		N	%
Casos	Válido	15	100,0
	Excluido	0	,0
	Total	15	100,0
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.			

Dentro del cuestionario para valorar la violencia familiar, la cual cuenta con 20 ítems. Por lo que la prueba piloto se tomó a un total de 15 estudiantes, el cual arroja como indicador 0,880, concluyendo que el instrumento es confiable.

Apéndice F. Matriz de consistencia

Enunciado	Objetivos	Variable (s)	Dimensiones / Indicadores	Metodología
¿Existe Relación entre el consumo de alcohol y la violencia familiar, en adolescentes de la Avenida Pastor Sevilla del distrito de Villa el Salvador, Lima- 2020?	Determinar la relación entre consumo de alcohol y violencia familiar, en en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020.	Consumo de alcohol	Consumo de riesgo de alcohol Síntomas de dependencia Consumo perjudicial de alcohol	Tipo: cuantitativo Nivel: relacional. Diseño: no experimental y transversal El universo, estuvo compuesto por adolescente del distrito de Villa el Salvador. La población estuvo constituida por los adolescentes de la Av. Pastor Sevilla, que cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión. Técnicas: encuesta y psicométrica. Instrumentos: Cuestionario Identification Test AUDIT Saunders et al. (1992) y cuestionario de violencia familiar por Zavaleta Orbegozo, Violeta E.
	<u>Específicos:</u> Determinar la relación entre la dimensión consumo de riesgo y violencia familiar, en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020	Violencia familiar	Nivel alto Nivel muy bajo Nivel bajo	
	Determinar la relación entre la dimensión síntoma de dependencia y violencia familiar, en en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020 Determinar la relación entre la entre la dimensión consumo perjudicial y violencia familiar, en en adolescentes, Villa el Salvador, Lima 2020			